

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis katėms ir mažiems šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

12,5 g antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

propoksuro 1,23 g;

pagalbinių medžiagų iki 12,5 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Antkaklis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės ir šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms ir mažiems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.

Veiklioji medžiaga iš antkaklio išsiskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, blusos nužudomos per kelias valandas. Prikibusios erkės žūsta maždaug po vienos dienos, po to jas galima lengvai pašalinti arba jos nukrenta pačios.

Retais atvejais erkės gali prikibti gyvūnui esant su antkakliu, bet paprastai jos tiesiog prikimba prie odos ir nukrenta, nesiurbusios kraujo.

Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti sergantiems (ypatingai esant mechaniniam nepraeinamumui virškinimo trakte ir šlapimo sistemos organuose, bronchinei astmai ar kitoms plaučių ir kraujotakos ligoms) arba sveikstantiems po ligos gyvūnams.

Negalima naudoti patelėms vėlyvoje vaikingumo stadijoje ir laktacijos metu.

Negalima naudoti jaunesniems nei 3 mėn. amžiaus kačiukams ir šuniukams.

Negalima naudoti esant didelių odos pažeidimų.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaistas yra išoriniam naudojimui skirtas insekticidinis antkaklis.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Iki naudojimo maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.

Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Dedant antkaklį reikia mūvėti pirštines. Bendraujant su gyvūnu vengti sąlyčio su antkakliu, palietus jį, plauti rankas.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaistui, turi vengti sąlyčio su juo.

Atsitiktinai antkakliui prisilietus prie odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.

Antkaklio neturėtų dėti moterys, esančios trečiame nėštumo trimestre.

Gyvūnus, seginčius Bolfo antkaklį, reikia laikyti atokiai nuo kūdikių ir vaikų.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis, uždėjus antkaklį. Pasireiškus šiems simptomams, antkaklį reikėtų nuimti ir nedėti tol, kol jie išnyks. Specialaus gydymo nereikia.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms ir laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais su keliomis gyvūnų rūšimis nenustatytas joks nepalankus poveikis vaikingumui.

Karbamatai gali sukelti lygiųjų raumenų susitraukimus, todėl Bolfo antkaklio negalima naudoti vėlyvoje vaikingumo stadijoje.

Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Šuniui ar katei segint antkaklį, negalima naudoti kitų insekticidų ar akaricidų.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo.

Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

Antkaklį reikia išimti iš apsauginio maišelio, išvynioti ir nuo vidinės antkaklio pusės nuplėšti plastikines juosteles. Po to gyvūnui ant kaklo antkaklį laisvai užsegti (rekomenduotina užsegti taip, kad tarp kaklo ir antkaklio liktų dviejų pirštų tarpas), o likusį laisvą galą nukirpti. Per pirmąsias dienas gyvūno laikytojui reikia apžiūrėti gyvūno odą aplink antkaklį, nes kai kuriems gyvūnams antkaklis gali sudirginti odą. Būtina nuolat tikrinti ar antkaklis gerai segimas.

Antkaklio veikimo trukmė priklauso nuo kailio ilgio ir būklės, gyvūno aktyvumo ir užsikrėtimo laipsnio. Jei gyvūno kailis ilgas, susivėlęs ar nešvarus, prieš užsegant antkaklį jį rekomenduotina išplauti šampūnu. Sumažėjus antkaklio efektyvumui, jį reikia pakeisti nauju.

Kailį reikia prižiūrėti kaip įprastai. Maudant gyvūną, antkaklį rekomenduotina nuimti ir uždėti, kai kailis nudžius. Dažnas kontaktas su vandeniu (lietus, plaukiojimas, maudymas) gali sumažinti antkaklio efektyvumą.

Esant užsikrėtimui blusomis, atitinkamais insekticidais gydyti reikia visus namuose laikomus gyvūnus.

Tinkamas naudojimas:

Be blusų, esančių ant katės ar šuns, gyvūno aplinkoje taip pat gali būti blusų kiaušinėlių, lervų ir lėliukių. Šie vėliau išsivystys į suaugusias blusas.

Norint pagerinti gydymo efektyvumą, rekomenduotina tinkamu insekticidu ar vabzdžių augimo reguliatoriumi (VAR) apdoroti gyvūną supančią aplinką ir mėgstamas poilsio vietas.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Atsižvelgiant į produkto tipą, perdozavimas mažai tikėtinas.

Gyvūnui atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti apsinuodijimo karbamatais simptomai: gausus seilėjimasis, vyzdžio susiaurėjimas, vėmimas ar viduriavimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

Priešnuodis – atropino sulfatas.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui.

ATCvet kodas: QP53AE02 propoksuras.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Propoksuras (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamatas) yra ektoparazitocidinis karbamo rūgšties darinys. Propoksuras slopina cholinesterazę, todėl cholinerginių nervų galūnėse susikaupia per didelis neurohormono acetilcholino kiekis ir dėl to blusos ir erkės žūsta. Žinduoliams propoksuras menkai toksiškas. Antkaklis veikliąją medžiagą išskiria nuolat.

Uždėjus antkaklį, vaistas nužudo blusas per kelias valandas ir toliau veikia keletą mėnesių.

5.2. Farmakokinetinės savybės.

Nėra įrodyta, kad veiklioji medžiaga veikia sistemiškai.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Dibutiladipatas,
propilenglikolio oktanoato dekanooatas,
epoksidintas sojų aliejus,
stearino rūgštis,
titano dioksidas,
geležies oksido hidratas,
geležies (III) oksidas,
geležies (II,III) oksidas,
polivinilchloridas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Permatomi maišeliai iš poliesterio ir polietileno po vieną apie 38 cm ilgio ir 12,5 g svorio rudos spalvos impregnuotą dirželį, kartoninėse dėžutėse po 1 vnt.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos, jei būtina

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/2/94/0077/001

9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

Registracijos data: 1994-04-29
Paskutinės perregistracijos data: 2010-07-30

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2011-01-21

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis dideliems šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

45 g antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:

propoksuro 4,442 g;

pagalbinių medžiagų iki 45 g.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Antkaklis.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos, nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Dideliems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.

Veiklioji medžiaga iš antkaklio išsiskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, blusos nužudomos per kelias valandas. Prikibusios erkės žūsta maždaug po vienos dienos, po to jas galima lengvai pašalinti arba jos nukrenta pačios.

Retais atvejais erkės gali prikibti gyvūnui esant su antkakliu, bet paprastai jos tiesiog prikimba prie odos ir nukrenta, nesiurbusios kraujo.

Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti sergantiems (ypatingai esant mechaniniam nepraeinamumui virškinimo trakte ir šlapimo sistemos organuose, bronchinei astmai ar kitoms plaučių ir kraujotakos ligoms) arba sveikstantiems po ligos gyvūnams.

Negalima naudoti patelėms vėlyvoje vaikingumo stadijoje ir laktacijos metu.

Negalima naudoti jaunesniems nei 3 mėn. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti esant didelių odos pažeidimų.

4.4. Specialieji nurodymai, naudojant atskirų rūšių paskirties gyvūnams

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Vaistas yra išoriniam naudojimui skirtas insekticidinis antkaklis.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Iki naudojimo maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.

Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Dedant antkaklį reikia mūvėti pirštines. Bendraujant su gyvūnu vengti sąlyčio su antkakliu, palietus jį, plauti rankas.

Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaistui, turi vengti sąlyčio su juo.

Atsitiktinai antkakliui prisilietus prie odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.

Antkaklio neturėtų dėti moterys, esančios trečiame nėštumo trimestre.

Gyvūnus, seginčius Bolfo antkaklį, reikia laikyti atokiai nuo kūdikių ir vaikų.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis uždėjus antkaklį. Pasireiškus šiems simptomams, antkaklį reikėtų nuimti ir nedėti tol, kol jie išnyks. Specialaus gydymo nereikia.

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms ir laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais tyrimais su keliomis gyvūnų rūšimis nenustatytas joks nepalankus poveikis vaikingumui.

Karbamatai gali sukelti lygiųjų raumenų susitraukimus, todėl Bolfo antkaklio negalima naudoti vėlyvoje vaikingumo stadijoje.

Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Šuniui segint antkaklį, negalima naudoti kitų insekticidų ar akaricidų.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo.

Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

Antkaklį reikia išimti iš apsauginio maišelio, išvynioti ir nuo vidinės antkaklio pusės nuplėšti plastikines juosteles. Po to gyvūnui ant kaklo antkaklį laisvai užsegti (rekomenduotina užsegti taip, kad tarp kaklo ir antkaklio liktų dviejų pirštų tarpas), o likusį laisvą galą nukirpti. Per pirmąsias dienas gyvūno laikytojui reikia apžiūrėti gyvūno odą aplink antkaklį, nes kai kuriems gyvūnams antkaklis gali sudirginti odą. Būtina nuolat tikrinti ar antkaklis gerai segimas.

Antkaklio veikimo trukmė priklauso nuo kailio ilgio ir būklės, gyvūno aktyvumo ir užsikrėtimo laipsnio. Jei gyvūno kailis ilgas, susivėlęs ar nešvarus, prieš užsegant antkaklį jį rekomenduotina išplauti šampūnu. Sumažėjus antkaklio efektyvumui, jį reikia pakeisti nauju.

Kailį reikia prižiūrėti kaip įprastai. Maudant gyvūną, antkaklį rekomenduotina nuimti ir uždėti, kai kailis nudžius. Dažnas kontaktas su vandeniu (lietus, plaukiojimas, maudymas) gali sumažinti antkaklio efektyvumą.

Esant užsikrėtimui blusomis, atitinkamais insekticidais gydyti reikia visus namuose laikomus gyvūnus.

Tinkamas naudojimas:

Be blusų, esančių ant šuns, gyvūno aplinkoje taip pat gali būti blusų kiaušinėlių, lervų ir lėliukių. Šie vėliau išsivystys į suaugusias blusas.

Norint pagerinti gydymo efektyvumą, rekomenduotina tinkamu insekticidu ar vabzdžių augimo reguliatoriumi (VAR) apdoroti gyvūną supančią aplinką ir mėgstamas poilsio vietas.

4.10 Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Atsižvelgiant į produkto tipą, perdozavimas mažai tikėtinas.

Gyvūnai atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti apsinuodijimo karbamatais simptomai: gausus seilėjimasis, vyzdžio susiaurėjimas, vėmimas ar viduriavimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.
Priešnuodis – atropino sulfatas.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui.
ATCvet kodas: QP53AE02 propoksuras.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Propoksuras (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamatas) yra ektoparazitocidinis karbamo rūgšties darinys. Propoksuras slopina cholinesterazę, todėl cholinerginių nervų galūnėse susikaupia per didelis neurohormono acetilcholino kiekis ir dėl to blusos ir erkės žūsta. Žinduoliams propoksuras menkai toksiškas. Antkaklis veikliąją medžiagą išskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, vaistas nužudo blusas per kelias valandas ir toliau veikia keletą mėnesių.

5.2. Farmakokinetinės savybės.

Nėra įrodyta, kad veiklioji medžiaga veikia sistemiškai.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Dibutiladipatas,
propilenglikolio oktanoato dekanooatas,
epoksidintas sojų aliejus,
stearino rūgštis,
titano dioksidas,
geležies oksido hidratas,
geležies (III) oksidas,
geležies (II,III) oksidas,
polivinilchloridas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 5 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Permatomi maišeliai iš poliesterio ir polietileno po vieną apie 70 cm ilgio ir 45 g svorio rudos spalvos impregnuotą dirželij, kartoninėse dėžutėse po 1 vnt.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos, jei būtina

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

7. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen
Vokietija

8. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS

LT/2/94/0077/002

9. REGISTRACIJOS/PERREGISTRACIJOS DATA

Registracijos data: 1994-04-29

Paskutinės perregistracijos data: 2010-07-30

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2011-01-21

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis katėms ir mažiems šunims

2. VEIKLIOJI IR KITA(-OS) MEDŽIAGOS

12,5 g antkaklyje yra: propoksuro 1,23 g.

3. VAISTO FORMA

Antkaklis.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 vnt.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės ir šunys.

6. INDIKACIJOS

Katėms ir mažiems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.

Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

7. NAUDOJIMO BŪDAS(-AI) IR METODAS

Užsegti ant kaklo.

Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

8. IŠLAUKA

Išlauka: nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/94/0077/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr.

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis dideliems šunims

2. VEIKLIOJI IR KITA(-OS) MEDŽIAGOS

45 g antkaklyje yra: propoksuro 4,442 g.

3. VAISTO FORMA

Antkaklis.

4. PAKUOTĖS DYDIS

1 vnt.

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Dideliems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.
Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

7. NAUDOJIMO BŪDAS(-AI) IR METODAS

Užsegti ant kaklo.
Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

8. IŠLAUKA

Išlauka: nenumatyta.

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI, JEI REIKIA

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Šiam vaistui specialių laikymo sąlygų nereikia.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA**

Nesunaudotas veterinarinis vaistas ar su juo susijusios atliekos turi būti sunaikintos pagal šalies reikalavimus.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TIEKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, jei taikytina**

Tik veterinariniam naudojimui.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. RINKODAROS TEISĖS NUMERIS (-IAI)

LT/2/94/0077/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
PAKELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis katėms ir mažiems šunims

2. VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS KIEKIS

Propoxur 1,23 g

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP

5. SERIJOS NUMERIS

Lot

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŪ PIRMINIŪ PAKUOČIŪ
PAKELIS**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis dideliems ūnims

2. VEIKLIOSIOS MEDŹIAGOS KIEKIS

Propoxur 4,442 g

3. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH

4. TINKAMUMO DATA

EXP

5. SERIJOS NUMERIS

Lot

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad us. vet.

INFORMACINIS LAPELIS
Bolfo, antkaklis katėms ir mažiems šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:
Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,
Projensdorfer Strasse 324,
D-24106 Kiel,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis katėms ir mažiems šunims

3. VEIKLIOJI (-SIOS) IR KITOS MEDŽIAGOS

12,5 g antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:
propoksuro 1,23 g.

4. INDIKACIJA (-OS)

Katėms ir mažiems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.

Veiklioji medžiaga iš antkaklio išsiskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, blusos nužudomos per kelias valandas. Prikibusios erkės žūsta maždaug po vienos dienos, po to jas galima lengvai pašalinti arba jos nukrenta pačios.

Retais atvejais erkės gali prikibti gyvūnui esant su antkakliu, bet paprastai jos tiesiog prikimba prie odos ir nukrenta, nesiurbusios kraujo.

Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems (ypatingai esant mechaniniam nepraeinamumui virškinimo trakte ir šlapimo sistemos organuose, bronchinei astmai ar kitoms plaučių ir kraujotakos ligoms) arba sveikstantiems po ligos gyvūnams.

Negalima naudoti patelėms vėlyvoje vaikingumo stadijoje ir laktacijos metu.

Negalima naudoti jaunesniems nei 3 mėn. amžiaus kačiukams ir šuniukams.

Negalima naudoti esant didelių odos pažeidimų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS POVEIKIS

Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir (ar) atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis uždėjus antkaklį. Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis, uždėjus antkaklį. Pasireiškus šiems simptomams, antkaklį reikėtų nuimti ir nedėti tol, kol jie išnyks. Specialaus gydymo nereikia.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinį gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės ir šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo.

Antkaklį reikia išimti iš apsauginio maišelio, išvynioti ir nuo vidinės antkaklio pusės nuplėšti plastikines juosteles. Po to gyvūnui ant kaklo antkaklį laisvai užsegti (rekomenduotina užsegti taip, kad tarp kaklo ir antkaklio liktų dviejų pirštų tarpas), o likusį laisvą galą nukirpti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

Per pirmąsias dienas gyvūno laikytoji reikia apžiūrėti gyvūno odą aplink antkaklį, nes kai kuriems gyvūnams antkaklis gali sudirginti odą. Būtina nuolat tikrinti ar antkaklis gerai segimas.

Antkaklio veikimo trukmė priklauso nuo kailio ilgio ir būklės, gyvūno aktyvumo ir užsikrėtimo laipsnio. Jei gyvūno kailis ilgas, susivėlęs ar nešvarus, prieš užsegant antkaklį jį rekomenduotina išplauti šampūnu. Sumažėjus antkaklio efektyvumui, jį reikia pakeisti nauju.

Kailį reikia prižiūrėti kaip įprastai. Maudant gyvūną, antkaklį rekomenduotina nuimti ir uždėti, kai kailis nudžius. Dažnas kontaktas su vandeniu (lietus, plaukiojimas, maudymas) gali sumažinti antkaklio efektyvumą.

Esant užsikrėtimui blusomis, atitinkamais insekticidais gydyti reikia visus namuose laikomus gyvūnus. Be blusų, esančių ant katės ar šuns, gyvūno aplinkoje taip pat gali būti blusų kiaušinėlių, lervų ir lėliukių. Šie vėliau išsivystys į suaugusias blusas.

Norint pagerinti gydymo efektyvumą, rekomenduotina tinkamu insekticidu ar vabzdžių augimo reguliatoriumi (VAR) apdoroti gyvūną supančią aplinką ir mėgstamas poilsio vietas.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistas yra išoriniam naudojimui skirtas insekticidinis antkaklis.

Iki naudojimo maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.
Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Dedant antkaklį reikia mūvėti pirštines. Bendraujant su gyvūnu vengti sąlyčio su antkakliu, palietus jį, plauti rankas.
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaistui, turi vengti sąlyčio su juo.
Atsitiktinai antkakliui prisilietus prie odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.
Antkaklio neturėtų dėti moterys, esančios trečiame nėštumo trimestre.
Gyvūnus, seginčius Bolfo antkaklį, reikia laikyti atokiai nuo kūdikių ir vaikų.
Laboratoriniais tyrimais su keliomis gyvūnų rūšimis nenustatytas joks nepalankus poveikis vaikingumui.
Karbamatai gali sukelti lygiųjų raumenų susitraukimus, todėl Bolfo antkaklio negalima naudoti vėlyvoje vaikingumo stadijoje.
Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.
Šuniui ar katei segint antkaklį, negalima naudoti kitų insekticidų ar akaricidų.
Atsižvelgiant į produkto tipą, perdozavimas mažai tikėtinas.
Gyvūnui atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti apsinuodijimo karbamatais simptomai: gausus seilėjimasis, vyzdžio susiaurėjimas, vėmimas ar viduriavimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į veterinarinį gydytoją. Priešnuodis – atropino sulfatas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaisto negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Bolfo antkaklis negali patekti į vandens telkinius, nes veiklioji medžiaga – propoksuras, yra toksiška vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-01-21

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui.
ATCvet kodas: QP53AE02 propoksuras.

Propoksuras (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamatas) yra ektoparazitocidinis karbamo rūgšties darinys. Propoksuras slopina cholinesterazę, todėl cholinerginių nervų galūnėse susikaupia per didelis neurohormono acetilcholino kiekis ir dėl to blusos ir erkės žūsta. Žinduoliams propoksuras menkai toksiškas. Antkaklis veikliąją medžiagą išskiria nuolat.
Uždėjus antkaklį, vaistas nužudo blusas per kelias valandas ir toliau veikia keletą mėnesių.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.

INFORMACINIS LAPELIS
Bolfo, antkaklis dideliems šunims

1. RINKODAROS TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Rinkodaros teisės turėtojas:
Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:
KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,
Projensdorfer Strasse 324,
D-24106 Kiel,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

Bolfo, antkaklis dideliems šunims

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

45 g antkaklyje yra:

veikliosios medžiagos:
propoksuro (2-izopoksifenil-N-metilkarbamato) 4,442 g.

4. INDIKACIJA (-OS)

Dideliems šunims, užsikrėtusiems blusomis (*Ctenocephalides* spp.) ir kraujasiurbėmis erkėmis (*Ixodes ricinus*), gydyti ir profilaktiškai.

Veiklioji medžiaga iš antkaklio išsiskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, blusos nužudomos per kelias valandas. Prikibusios erkės žūsta maždaug po vienos dienos, po to jas galima lengvai pašalinti arba jos nukrenta pačios.

Retais atvejais erkės gali prikibti gyvūnui esant su antkakliu, bet paprastai jos tiesiog prikimba prie odos ir nukrenta, nesiurbusios kraujo.

Nuo blusų antkaklis apsaugo iki 4 mėn., nuo erkių – iki 10 sav.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti sergantiems (ypatingai esant mechaniniam nepraeinamumui virškinimo trakte ir šlapimo sistemos organuose, bronchinei astmai ar kitoms plaučių ir kraujotakos ligoms) arba sveikstantiems po ligos gyvūnams.

Negalima naudoti patelėms vėlyvoje vaikingumo stadijoje ir laktacijos metu.

Negalima naudoti jaunesniems nei 3 mėn. amžiaus šuniukams.

Negalima naudoti esant didelių odos pažeidimų.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS POVEIKIS

Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir (ar) atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis uždėjus antkaklį. Labai jautriems šunims gali sudirgti oda ir atsirasti niežulys, ypač pirmomis dienomis, uždėjus antkaklį. Pasireiškus šiems simptomams, antkaklį reikėtų nuimti ir nedėti tol, kol jie išnyks. Specialaus gydymo nereikia.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS (-AI) IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Antkaklį reikia užsegti gyvūnui ant kaklo.

Antkaklį reikia išimti iš apsauginio maišelio, išvynioti ir nuo vidinės antkaklio pusės nuplėšti plastikines juosteles. Po to gyvūnui ant kaklo antkaklį laisvai užsegti (rekomenduotina užsegti taip, kad tarp kaklo ir antkaklio liktų dviejų pirštų tarpas), o likusį laisvą galą nukirpti.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Vienas antkaklis skirtas naudoti vienam gyvūnui.

Per pirmąsias dienas gyvūno laikytojai reikia apžiūrėti gyvūno odą aplink antkaklį, nes kai kuriems gyvūnams antkaklis gali sudirginti odą. Būtina nuolat tikrinti ar antkaklis gerai segimas.

Antkaklio veikimo trukmė priklauso nuo kailio ilgio ir būklės, gyvūno aktyvumo ir užsikrėtimo laipsnio. Jei gyvūno kailis ilgas, susivėlęs ar nešvarus, prieš užsegant antkaklį jį rekomenduotina išplauti šampūnu. Sumažėjus antkaklio efektyvumui, jį reikia pakeisti nauju.

Kailį reikia prižiūrėti kaip įprastai. Maudant gyvūną, antkaklį rekomenduotina nuimti ir uždėti, kai kailis nudžius. Dažnas kontaktas su vandeniu (lietus, plaukiojimas, maudymas) gali sumažinti antkaklio efektyvumą.

Esant užsikrėtimui blusomis, atitinkamais insekticidais gydyti reikia visus namuose laikomus gyvūnus. Be blusų, esančių ant katės ar šuns, gyvūno aplinkoje taip pat gali būti blusų kiaušinėlių, lervų ir lėliukių. Šie vėliau išsivystys į suaugusias blusas.

Norint pagerinti gydymo efektyvumą, rekomenduotina tinkamu insekticidu ar vabzdžių augimo reguliatoriumi (VAR) apdoroti gyvūną supančią aplinką ir mėgstamas poilsio vietas.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Vaistas yra išoriniam naudojimui skirtas insekticidinis antkaklis.

Iki naudojimo maišelį reikia laikyti sandariai uždarytą.
Vengti tiesioginio sąlyčio su oda. Dedant antkaklį reikia mūvėti pirštines. Bendraujant su gyvūnu vengti sąlyčio su antkakliu, palietus jį, plauti rankas.
Žmonės, kuriems nustatytas padidėjęs jautrumas vaistui, turi vengti sąlyčio su juo.
Atsitiktinai antkakliui prisilietus prie odos, nedelsiant plauti dideliu kiekiu vandens.
Antkaklio neturėtų dėti moterys, esančios trečiame nėštumo trimestre.
Gyvūnus, seginčius Bolfo antkaklį, reikia laikyti atokiai nuo kūdikių ir vaikų.
Laboratoriniais tyrimais su keliomis gyvūnų rūšimis nenustatytas joks nepalankus poveikis vaikingumui.
Karbamatai gali sukelti lygiųjų raumenų susitraukimus, todėl Bolfo antkaklio negalima naudoti vėlyvoje vaikingumo stadijoje.
Negalima naudoti patelėms laktacijos metu.
Šuniui ar katei segint antkaklį, negalima naudoti kitų insekticidų ar akaricidų.
Atsižvelgiant į produkto tipą, perdozavimas mažai tikėtinas.
Gyvūnui atsitiktinai prarijus, gali pasireikšti apsinuodijimo karbamatais simptomai: gausus seilėjimasis, vyzdžio susiaurėjimas, vėmimas ar viduriavimas. Tokiu atveju būtina nedelsiant kreiptis į veterinarinį gydytoją. Priešnuodis – atropino sulfatas.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS, JEI BŪTINA

Vaisto negalima išmesti į kanalizaciją ar su buitinėmis atliekomis.
Bolfo antkaklis negali patekti į vandens telkinius, nes veiklioji medžiaga – propoksuras, yra toksiška vandens organizmams.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2011-01-21

15. KITA INFORMACIJA

Parduodama be recepto.
Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos išoriniam naudojimui.
ATCvet kodas: QP53AE02 propoksuras.

Propoksuras (2-izopropoksifenil-N-metilkarbamatas) yra ektoparazitocidinis karbamo rūgšties darinys. Propoksuras slopina cholinesterazę, todėl cholinerginių nervų galūnėse susikaupia per didelis neurohormono acetilcholino kiekis ir dėl to blusos ir erkės žūsta. Žinduoliams propoksuras menkai toksiškas. Antkaklis veikliąją medžiagą išskiria nuolat. Uždėjus antkaklį, vaistas nužudo blusas per kelias valandas ir toliau veikia keletą mėnesių.

Norint gauti informaciją apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su rinkodaros teisės turėtojo vietiniu atstovu.