

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas katėms

ADVANTAGE 80, užlašinamasis tirpalas katėms

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienadozėje atitinkamai 0,4 ml arba 0,8 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg arba 80 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,4 mg arba 0,8 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Katės.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Katėms gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Katėms, sveriančioms mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40, sveriančioms 4 kg ir daugiau – ADVANTAGE 80.

Vieną kartą gydyta katė blusomis neužsikrečia 4 sav. Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant kates, sergančias blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti neatjunkytiems kačiukams iki 8 sav. amžiaus.

4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo gyvūno akis ar burną. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laišyti vieniems kitų.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniui.

Asmenys, kurių oda yra jautri, gali būti ypatingai jautrūs šiam vaistui.

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų į akis ar burną.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniui. Jei odos ar akių sudirgimas išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją.

Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis.

Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo (taip pat žr.

4.9 p. „Dozės ir naudojimo būdas“).

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais imidakloprido tyrimais su žiurkėmis ir triušiais, joks embriotoksinis, teratogeninis ar toksinis reprodukcijai poveikis nenustatytas. Nėra pakankamai tyrimų su katingomis ar katėmis laktacijos metu bei jų jaunikliais, tačiau, remiantis esamais duomenimis, nepalankios reakcijos joms menkai tikėtinos.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Sąveika tarp šio vaisto, naudojus du kartus didesnę nei rekomenduotina dozę, ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų (lufenurono, pirantelio ir prazikvantelio) nenustatyta. Vaistą taip pat galima naudoti, tuo pat metu atliekant įprastas veterinarinei praktikai procedūras, pvz., vakcinaciją.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Dozavimo ir gydymo planas

Katės svoris, kg	Vaistas	Tūbelių skaičius	mg/kg kūno svorio
Mažiau kaip 4 kg	ADVANTAGE 40	1 x 0,4 ml	ne mažiau kaip 10
4 kg ir daugiau	ADVANTAGE 80	1 x 0,8 ml	ne mažiau kaip 20

Per šešias savaites ar vėliau, aplinkoje gali atsirasti kita blusų karta, todėl gali prireikti gydymą kartoti, priklausomai nuo aplinkoje esančių blusų kiekio. Norint sumažinti suaugusių ir besivystančių blusų kiekį aplinkoje, rekomenduotina papildomai naudoti tam tinkančias priemones.


Vaistas efektyvus net sudrėkus kailiui, pvz., sulijus stipriam lietui. Tačiau gali tekti gydyti pakartotinai, nelygu, koks blusų kiekis aplinkoje. Negalima vaisto naudoti dažniau nei kartą per savaitę.

Naudojimo būdas

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarumą.



Katės kailį ant kaklo prie pat kaukolės pagrindo reikia praskirti, kad matytųsi oda.



Tūbelės antgalį reikia priliesti prie odos ir, tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę, išspausti jos turinį ant odos.

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Užlašinus prie kaukolės pagrindo, katė rečiau nulaižo vaistą.

Vaistą reikia lašinti tik ant nepažeistos odos. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vieniems kitų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai), jei būtina

Skyrus katėms kas savaitę penkis kartus didesnes nei rekomenduotina dozes 8 sav. iš eilės, jokių nepalankių klinikinių požymių nepasireiškė.

Katei atsitiktinai prarijus vaisto, apsinuodijimas menkai tikėtinas. Taip atsitikus, būtina gydyti simptomiškai, prižiūrint veterinarijos gydytojui. Specifinio priešnuodžio nėra, naudinga skirti aktyviąją anglį.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX17.

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloronikotinilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas kaip chloronikotino nitroguanidinas.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Imidakloprido farmakologinės savybės yra neįprastos. Medžiaga pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio perdavimo slopinimo sukeliama vabzdžių paralyžius ir žūtis. Imidaklopridas iš esmės neveikia žinduolių CNS, nes menkai sąveikauja su žinduolių nikotinerginiais receptoriais ir prastai prasiskverbia per žinduolių kraujo-smegenų barjerą. Žinduoliams imidakloprido farmakologinis poveikis yra minimalus, ką rodo ir saugumo tyrimai, sistemiskai naudojus subletalias vaisto dozes triušiams, pelėms ir žiurkėms.

Naujausiais tyrimais nustatyta, kad imidaklopridas žudo ne tik suaugusias blusas, bet lervicidiškai veikia ir lervas gydytą gyvūną supančioje aplinkoje. Aplinkoje esančios blusų lervos žūva po sąlyčio su gydytu gyvūnu.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Vaistas skirtas lašinti ant odos. Katėms užlašintas imidaklopridas greitai pasiskirsto po visą gyvūno kailį. Ūmiai odos tyrimais su žiurkėmis ir perdozavimo bei kraujo serumo kinetikos tyrimais su paskirties gyvūnais nustatyta, kad sisteminė imidakloprido absorbcija yra labai menka, laikina ir nėra svarbi klinikiniam veikimui. Tai buvo įrodyta ir kitais tyrimais, kurių metu nuo gydyto gyvūno odos ir kailio pašalinus visą veikliąją medžiagą, kailyje esančios blusos nežuvo.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas, benzilo alkoholis, propileno karbonatas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polipropileninės tūbelės atitinkamai po 0,4 ml ir 0,8 ml, lizduotėse po 4 vnt., kartoninėse dėžutėse.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

7. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/02/1405/001

LT/2/02/1405/002

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2007-06-11

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2010-03-15

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 0,4 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,4 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 0,4 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

6. INDIKACIJOS

Katėms, sveriančioms mažiau kaip 4 kg, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant kates, sergančias blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/001

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 80, užlašinamasis tirpalas katėms

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 0,8 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 80 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,8 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 0,8 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

6. INDIKACIJOS

Katėms, sveriančioms 4 kg ir daugiau, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant kates, sergančias blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/002

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŽŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katėms.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĒ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 80

2. KIEKIS (MASĒ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,8 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katĕms.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mĕnuo/metai}

8. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katėms.

4. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 0,4 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 80

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katėms.

2. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 0,8 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

INFORMACINIS LAPELIS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas katėms

ADVANTAGE 80, užlašinamasis tirpalas katėms

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Tiekimo rinkai teisės turėtojas:

Bayer Animal Health GmbH,

51368 Leverkusen,

Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,

Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,

Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas katėms

ADVANTAGE 80, užlašinamasis tirpalas katėms

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje atitinkamai 0,4 ml arba 0,8 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg arba 80 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitoluenu (antioksidanto) 0,4 mg arba 0,8 mg.

4. INDIKACIJA

Katėms gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Katėms, sveriančioms mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40, sveriančioms 4 kg ir daugiau – ADVANTAGE 80.

Vieną kartą gydyta katė blusomis neužsikrečia 4 sav. Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant kates, sergančias blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti neatjunkytiems kačiukams iki 8 sav. amžiaus.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis.

Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo.

Pastebėjus bet kokią sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarinės gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Katės.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dozavimo ir gydymo planas


Katės svoris, kg	Vaistas	Tūbelių skaičius	mg/kg kūno svorio
Mažiau kaip 4 kg	ADVANTAGE 40	1 x 0,4 ml	ne mažiau kaip 10
4 kg ir daugiau	ADVANTAGE 80	1 x 0,8 ml	ne mažiau kaip 20

Per šešias savaites ar vėliau, aplinkoje gali atsirasti kita blusų karta, todėl gali prirreikti gydymą kartoti, priklausomai nuo aplinkoje esančių blusų kiekio. Norint sumažinti suaugusių ir besivystančių blusų kiekį aplinkoje, rekomenduotina papildomai naudoti tam tinkančias priemones.


Vaistas efektyvus net sudrėkus kailiui, pvz., sulijus stipriam lietu. Tačiau gali tekti gydyti pakartotinai, nelygu, koks blusų kiekis aplinkoje. Negalima vaisto naudoti dažniau nei kartą per savaitę.

Naudojimo būdas

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarumą.



Katės kailį ant kaklo prie pat kaukolės pagrindo reikia praskirti, kad matytųsi oda.



Tūbelės antgalį reikia priliesti prie odos ir, tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę, išspausti jos turinį ant odos.

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Užlašinus prie kaukolės pagrindo, katė rečiau nulaižo vaistą.

Vaistą reikia lašinti tik ant nepažeistos odos. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vieniems kitų.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Katėms, sveriančioms mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40.

Katėms, sveriančioms 4 kg ir daugiau, reikia naudoti ADVANTAGE 80.

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo gyvūno akis ar burną.

Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vieniems kitų.

Laboratoriniais imidakloprido tyrimais su žiurkėmis ir triušiais, joks embriotoksinis, teratogeninis ar toksinis reprodukcijai poveikis nenustatytas. Nėra pakankamai tyrimų su katingomis ar katėmis laktacijos metu bei jų jaunikliais, tačiau, remiantis esamais duomenimis, nepalankios reakcijos joms menkai tikėtinos.

Sąveika tarp šio vaisto, naudojus du kartus didesnę nei rekomenduotina dozė, ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų (lufenurono, pirantelio ir prazikvantelio) nenustatyta. Vaistą taip pat galima naudoti, tuo pat metu atliekant įprastas veterinarinei praktikai procedūras, pvz., vakcinaciją.

Skyrus katėms kas savaitę penkis kartus didesnes nei rekomenduotina dozės 8 sav. iš eilės, jokių nepalankių klinikinių požymių nepasireiškė.

Katei atsitiktinai prarijus vaisto, apsinuodijimas menkai tikėtinas. Taip atsitikus, būtina gydyti simptomiškai, prižiūrint veterinarijos gydytojui. Specifinio priešnuodžio nėra, naudinga skirti aktyviąją anglį.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Asmenys, kurių oda yra jautri, gali būti ypatingai jautrūs šiam vaistui.

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų į akis ar burną.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu. Jei odos ar akių sudirgimas išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją.

Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-03-15

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: ektoparaziticidinės medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX17

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparaziticidinė medžiaga, priklausanti chloronikotinilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas kaip chloronikotino nitroguanidinas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo vietiniu atstovu.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 100, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 250, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 400, užlašinamasis tirpalas šunims

2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Vienadozėje atitinkamai 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml, arba 4 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg, 100 mg, 250 mg arba 400 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,4 mg, 1,0 mg, 2,5 mg arba 4,0 mg.

Išsamų pagalbinių medžiagų sąrašą žr. 6.1 p.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. KLINIKINIAI DUOMENYS

4.1. Paskirties gyvūnų rūšys

Šunys.

4.2. Naudojimo indikacijos nurodant paskirties gyvūnų rūšis

Šunims gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Šunims, sveriantiems mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40, sveriantiems 4–10 kg – ADVANTAGE 100, sveriantiems 10–25 kg – ADVANTAGE 250, sveriantiems 25–40 kg, – ADVANTAGE 400.

Naudojus vaistą, blusos šuns kailyje žūsta per vieną parą. Vieną kartą gydytas šuo blusomis neužsikrečia 4 sav. Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

4.3. Kontraindikacijos

Negalima naudoti neatjunkytiems šuniukams iki 8 sav. amžiaus.

4.4. Specialieji nurodymai

Nėra.

4.5. Specialios naudojimo atsargumo priemonės

Specialios atsargumo priemonės, naudojant vaistą gyvūnams

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo gyvūno akis ar burną. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laizyti vieniems kitų.

Specialios atsargumo priemonės asmenims, naudojantiems vaistą gyvūnams

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniu.

Asmenys, kurių oda yra jautri, gali būti ypatingai jautrūs šiam vaistui.

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų į akis ar burną.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniu. Jei odos ar akių sudirgimas išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją.

Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

4.6. Nepalankios reakcijos (dažnumas ir sunkumas)

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo (taip pat žr. 4.9 p. „Dozės ir naudojimo būdas“).

4.7. Naudojimas vaikingoms patelėms, laktacijos ar kiaušinių dėjimo metu

Laboratoriniais imidakloprido tyrimais su žiurkėmis ir triušiais joks embriotoksinis, teratogeninis ar toksinis reprodukcijai poveikis nenustatytas. Nėra pakankamai tyrimų su šuningomis ar kalėmis laktacijos metu bei jų jaunikliais, tačiau, remiantis esamais duomenimis, nepalankios reakcijos joms menkai tikėtinos.

4.8. Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Sąveika tarp šio vaisto, naudojus du kartus didesnę nei rekomenduotina dozė, ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų (lufenurono, pirantelio ir prazikvantelio) nenustatyta. Vaistą taip pat galima naudoti, tuo pat metu atliekant įprastas veterinarinei praktikai procedūras, pvz., vakcinaciją.

4.9. Dozės ir naudojimo būdas

Dozės ir gydymo planas


Šuns svoris, kg	Vaistas	Tūbelių skaičius	mg/kg kūno svorio
mažiau kaip 4 kg	ADVANTAGE 40	1 x 0,4 ml	ne mažiau kaip 10
4–10 kg	ADVANTAGE 100	1 x 1 ml	10–25
10–25 kg	ADVANTAGE 250	1 x 2,5 ml	10–25
25–40 kg	ADVANTAGE 400	1 x 4 ml	ne daugiau kaip 16
daugiau kaip 40 kg	ADVANTAGE 400	2 x 4 ml	ne daugiau kaip 20

Per šešias savaites ar vėliau, aplinkoje gali atsirasti kita blusų karta, todėl gali prireikti gydymą kartoti, priklausomai nuo aplinkoje esančių blusų kiekio. Norint sumažinti suaugusių ir besivystančių blusų kiekį aplinkoje, rekomenduotina papildomai naudoti tam tinkančias priemones.


Vaistas efektyvus net sudrėkus kailiui, pvz., plaukiojus ar sulijus stipriam lietu. Tačiau dažnai plaukiojant ar maudant, gali tekti gydyti pakartotinai, nelygu, koks blusų kiekis aplinkoje. Negalima vaisto naudoti dažniau nei kartą per savaitę.

Naudojimo būdas

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarumą.



Stovinčiam šuniui reikia praskirti kailį tarp menčių, kad matytųsi oda.



Tūbelės antgalį reikia priliesti prie odos ir, tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę, išspausti jos turinį ant odos.

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaužo lašavimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Tinkamai naudojant vaistą, lašavimo vieta rečiau nulaužoma.

Vaistą reikia lašinti tik ant nepažeistos odos. Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laižyti vieniems kitų.

4.10. Perdozavimas (simptomai, pirmosios pagalbos priemonės, priešnuodžiai)

Skyrus šunims vienkartinės vaisto dozės iki 200 mg/kg kūno svorio (5–8 kartus didesnes nei gydomasias), penkias dienas iš eilės skyrus 100 mg/kg kūno svorio ar kas savaitę gydžius penkis kartus didesnėmis nei rekomenduotina dozėmis aštuonias savaites iš eilės, jokių nepalankių klinikinių požymių nepasireiškė.

Šuniui atsitiktinai prarijus vaisto, apsinuodijimas menkai tikėtinas. Taip atsitikus, būtina gydyti simptomiškai, prižiūrint veterinarijos gydytojui. Specifinio priešnuodžio nėra, naudinga skirti aktyviają anglį.

4.11. Išlauka

Nenumatyta.

5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX17.

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloronikotinilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas kaip chloronikotino nitroguanidinas.

5.1. Farmakodinaminės savybės

Imidakloprido farmakologinės savybės yra neįprastos. Medžiaga pasižymi dideliu afinitetu blusų centrinės nervų sistemos (CNS) posinapsinės srities nikotinerginiams acetilcholino receptoriams. Dėl cholinerginio perdavimo slopinimo sukeliama vabzdžių paralyžius ir žūtis. Imidaklopridas iš esmės neveikia žinduolių CNS, nes menkai sąveikauja su žinduolių nikotinerginiais receptoriais ir prastai prasiskverbia per žinduolių kraujo-smegenų barjerą. Žinduoliams imidakloprido farmakologinis poveikis yra minimalus, ką rodo ir saugumo tyrimai, sistemiskai naudojus subletalias vaisto dozes triušiams, pelėms ir žiurkėms.

Naujausiais tyrimais nustatyta, kad imidaklopridas žudo ne tik suaugusias blusas, bet lervicidiškai veikia ir jų lervas gydytą gyvūną supančioje aplinkoje. Aplinkoje esančios blusų lervos žūva po sąlyčio su gydytu gyvūnu.

5.2. Farmakokinetinės savybės

Vaistas skirtas lašinti ant odos. Šunims užlašintas imidaklopridas greitai pasiskirsto po visą gyvūno odą. Ūminiais odos tyrimais su žiurkėmis ir perdozavimo bei kraujo serumo kinetikos tyrimais su paskirties gyvūnais nustatyta, kad sistemiskai imidaklopridas absorbuojamas labai menkai, greit pranyksta ir nėra svarbus klinikiniam veikimui. Tai buvo įrodyta ir kitais tyrimais, kurių metu nuo gydyto gyvūno odos ir kailio pašalinus visą veikliąją medžiagą, kailyje esančios blusos nežuvo.

6. FARMACINIAI DUOMENYS

6.1. Pagalbinių medžiagų sąrašas

Butilhidroksitoluenas, benzilo alkoholis, propileno karbonatas.

6.2. Nesuderinamumai

Nežinomi.

6.3. Tinkamumo laikas

Veterinarinio vaisto tinkamumo laikas, nepažeidus originalios pakuotės, – 3 metai.

6.4. Specialieji laikymo nurodymai

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

6.5. Pirminės pakuotės pobūdis ir sudedamosios dalys

Polipropilininės tūbelės atitinkamai po 0,4 ml, 1,0 ml, 2,5 ml arba 4 ml, lizduotėse po 4 vnt., kartoninėse dėžutėse.

6.6. Specialios nesunaudoto veterinarinio vaisto ar su jo naudojimu susijusių atliekų naikinimo nuostatos

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

7. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

8. REGISTRACIJOS NUMERIAI

LT/2/02/1405/003

LT/2/02/1405/004

LT/2/02/1405/005

LT/2/02/1405/006

9. PERREGISTRACIJOS DATA

2007-06-11

10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA

2010-03-15

DRAUDIMAS PREKIAUTI, TIEKTI IR (ARBA) NAUDOTI

Nėra.

ŽENKLINIMAS

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas šunims

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 0,4 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,4 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 0,4 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims, sveriantiems mažiau kaip 4 kg, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos tarp menčių.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina išdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/003

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 100, užlašinamasis tirpalas šunims

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 1 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 100 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 1,0 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 1 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims, sveriantiems 4–10 kg, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos tarp menčių.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/004

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

**DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS
KARTONINĖ DĖŽUTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 250, užlašinamasis tirpalas šunims

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 2,5 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 250 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 2,5 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 2,5 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims, sveriantiems 10–25 kg, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos tarp menčių.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/005

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

DUOMENYS, KURIE TURI BŪTI ANT ANTRINĖS PAKUOTĖS

KARTONINĖ DĖŽUTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 400, užlašinamasis tirpalas šunims

2. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje 4 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 400 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 4,0 mg.

3. VAISTO FORMA

Užlašinamasis tirpalas.

4. PAKUOTĖS DYDIS

4 tūbelės po 4 ml

5. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

6. INDIKACIJOS

Šunims, sveriantiems 25–40 kg, gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

7. NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS

Lašinti ant odos tarp menčių.

8. IŠLAUKA

9. SPECIALIEJI ĮSPĖJIMAI

Prieš naudojimą būtina įdėmiai perskaityti informacinį lapelį.

10. TINKAMUMO DATA

Tinka iki {mėnuo/metai}

11. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

**12. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO (-IŲ) VAISTO (-Ų) AR ATLIEKŲ
NAIKINIMO NUOSTATOS**

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

**13. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“ IR TEIKIMO BEI
NAUDOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI**

Tik veterinariniam naudojimui.
Parduodama be veterinarinio recepto.

14. NUORODA „SAUGOTI NUO VAIKŲ“

Saugoti nuo vaikų.

15. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS

Bayer Animal Health GmbH,
D-51368 Leverkusen,
Vokietija

16. REGISTRACIJOS NUMERIS

LT/2/02/1405/006

17. GAMINTOJO SERIJOS NUMERIS

Ser. Nr. {numeris}

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĒ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40

2. KIEKIS (MASĒ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

0,4 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 100

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

1,0 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 250

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

2,5 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT MAŖŲ PIRMINIŲ PAKUOČIŲ
TŪBELĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 400

2. KIEKIS (MASĖ, TŪRIS AR DOZIŲ SKAIČIUS)

4 ml

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

6. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 0,4 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 100

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŽIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 1,0 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 250

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŹIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŖYS

Ŗunims.

4. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 2,5 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

**MINIMALŪS DUOMENYS ANT LIZDUOČIŲ AR JUOSTINIŲ PAKUOČIŲ
LIZDUOTĖ**

1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 400

2. VEIKLIOSIOS (-IŲJŲ) MEDŹIAGOS (-Ų) KIEKIS

Imidacloprid 100 mg/ml.

3. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunims.

4. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO PAVADINIMAS

Bayer Animal Health GmbH, Vokietija

5. PAKUOTĖS DYDIS

4 x 4,0 ml

3. TINKAMUMO DATA

EXP {mėnuo/metai}

4. SERIJOS NUMERIS

Lot {numeris}

5. NUORODA „TIK VETERINARINIAM NAUDOJIMUI“

Ad.us.vet.

INFORMACINIS LAPELIS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 100, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 250, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 400, užlašinamasis tirpalas šunims

1. TIEKIMO RINKAI TEISĖS TURĖTOJO IR UŽ VAISTO SERIJOS IŠLEIDIMĄ EEE ŠALYSE ATSAKINGO GAMINTOJO, JEI JIE SKIRTINGI, PAVADINIMAS IR ADRESAS

Tiekimo rinkai teisės turėtojas:

Bayer Animal Health GmbH,
51368 Leverkusen,
Vokietija

Vaisto serijos gamintojas:

KVP Pharma + Veterinär Produkte GmbH,
Projensdorfer Str. 324, 24106 Kiel,
Vokietija

2. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS

ADVANTAGE 40, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 100, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 250, užlašinamasis tirpalas šunims
ADVANTAGE 400, užlašinamasis tirpalas šunims

3. VEIKLIOJI IR KITOS MEDŽIAGOS

Vienadozėje atitinkamai 0,4 ml, 1 ml, 2,5 ml, arba 4 ml tūbelėje yra:

veikliosios medžiagos:

imidakloprido 40 mg, 100 mg, 250 mg arba 400 mg;

pagalbinės medžiagos:

butilhidroksitolueno (antioksidanto) 0,4 mg, 1,0 mg, 2,5 mg arba 4,0 mg.

4. INDIKACIJA

Šunims gydyti ir profilaktiškai nuo blusų.

Šunims, sveriantiems mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40, sveriantiems 4–10 kg – ADVANTAGE 100, sveriantiems 10–25 kg – ADVANTAGE 250, sveriantiems 25–40 kg, – ADVANTAGE 400.

Naudojus vaistą, blusos šuns kailyje žūsta per vieną parą. Vieną kartą gydytas šuo blusomis neužsikrečia 4 sav. Vaistą galima naudoti kaip pagalbinę priemonę, gydant šunis, sergančius blusų sukeltu alerginiu dermatitu.

5. KONTRAINDIKACIJOS

Negalima naudoti neatjunkietyms šuniukams iki 8 sav. amžiaus.

6. NEPALANKIOS REAKCIJOS

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaižo lašinimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Pastebėjus bet kokį sunkų poveikį ar kitą šiame informaciniame lapelyje nepaminėtą poveikį, būtina informuoti veterinarijos gydytoją.

7. PASKIRTIES GYVŪNŲ RŪŠYS

Šunys.

8. DOZĖS, NAUDOJIMO BŪDAS IR METODAS KIEKVIENAI RŪŠIAI

Dozės ir gydymo planas


Šuns svoris, kg	Vaistas	Tūbelių skaičius	mg/kg kūno svorio
mažiau kaip 4 kg	ADVANTAGE 40	1 x 0,4 ml	ne mažiau kaip 10
4–10 kg	ADVANTAGE 100	1 x 1 ml	10–25
10–25 kg	ADVANTAGE 250	1 x 2,5 ml	10–25
25–40 kg	ADVANTAGE 400	1 x 4 ml	ne daugiau kaip 16
daugiau kaip 40 kg	ADVANTAGE 400	2 x 4 ml	ne daugiau kaip 20

Per šešias savaites ar vėliau, aplinkoje gali atsirasti kita blusų karta, todėl gali prirreikti gydymą kartoti, priklausomai nuo aplinkoje esančių blusų kiekio. Norint sumažinti suaugusių ir besivystančių blusų kiekį aplinkoje, rekomenduotina papildomai naudoti tam tinkančias priemones.


Vaistas efektyvus net sudrėkus kailiui, pvz., plaukiojus ar sulijus stipriam lietu. Tačiau dažnai plaukiojant ar maudant, gali tekti gydyti pakartotinai, nelygu, koks blusų kiekis aplinkoje. Negalima vaisto naudoti dažniau nei kartą per savaitę.

Naudojimo būdas

Tūbelę išimti iš pakuotės. Laikant vertikaliai, pasukti ir nuimti apsauginį gaubtelį. Jį kitu galu užsukti ant tūbelės, pažeidžiant sandarumą.



Stovinčiam šuniui reikia praskirti kailį tarp menčių, kad matytųsi oda.



Tūbelės antgalį reikia priliesti prie odos ir, tvirtai keletą kartų paspaudus tūbelę, išspausti jos turinį ant odos.

Vaistas yra kartus. Jei gyvūnas iš karto po naudojimo nulaužo lašavimo vietą, gali atsirasti seilėtekis. Tai nėra apsinuodijimo požymis, jis išnyksta po kelių minučių be papildomo gydymo. Tinkamai naudojant vaistą, lašavimo vieta rečiau nulaužoma.

Vaistą reikia lašinti tik ant nepažeistos odos.

9. NUORODOS DĖL TINKAMO NAUDOJIMO

Šunims, sveriantiems mažiau kaip 4 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 40.

Šunims, sveriantiems 4–10 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 100.

Šunims, sveriantiems 10–25 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 250.

Šunims, sveriantiems 25–40 kg, reikia naudoti ADVANTAGE 400.

Būtina stengtis, kad tūbelės turinys ar užlašinta dozė nepatektų į gydomo gyvūno akis ar burną.

Negalima leisti ką tik gydytiems gyvūnams laišyti vieniems kitų.

Sąveika tarp šio vaisto, naudojus du kartus didesnę nei rekomenduotina dozę, ir įprastai naudojamų veterinarinių vaistų (lufenurono, pirantelio ir prazikvantelio) nenustatyta. Vaistą taip pat galima naudoti, tuo pat metu atliekant įprastas veterinarinei praktikai procedūras, pvz., vakcinaciją.

Skyrus šunims vienkartinės vaisto dozes iki 200 mg/kg kūno svorio (5–8 kartus didesnes nei gydomasias), penkias dienas iš eilės skyrus 100 mg/kg kūno svorio ar kas savaitę gydžius penkis kartus didesnėmis nei rekomenduotina dozėmis aštuonias savaites iš eilės, jokių nepalankių klinikinių požymių nepasireiškė.

Šuniui atsitiktinai prarijus vaisto, apsinuodijimas menkai tikėtinas. Taip atsitikus, būtina gydyti simptomiškai, prižiūrint veterinarijos gydytojui. Specifinio priešnuodžio nėra, naudinga skirti aktyviają anglį.

10. IŠLAUKA

Nenumatyta.

11. SPECIALIEJI LAIKYMO NURODYMAI

Saugoti nuo vaikų.

Laikyti atokiai nuo maisto, gėrimų ir gyvūnų pašarų.

12. SPECIALIEJI NURODYMAI

Po naudojimo reikia kruopščiai nusiplauti rankas.

Atsitiktinai patekus ant odos, nedelsiant reikia plauti muilu ir vandeniui.

Asmenys, kurių oda yra jautri, gali būti ypatingai jautrūs šiam vaistui.

Būtina vengti, kad vaisto nepatektų į akis ar burną.

Vaisto atsitiktinai patekus į akis, nedelsiant reikia kruopščiai plauti vandeniui. Jei odos ar akių sudirgimas išlieka arba vaistas atsitiktinai nuryjamas, reikia kreiptis į gydytoją.

Naudojant vaistą negalima valgyti, gerti ar rūkyti.

13. SPECIALIOS NESUNAUDOTO VETERINARINIO VAISTO AR ATLIEKŲ NAIKINIMO NUOSTATOS

Naudojus vaistą, gaubtelį reikia uždėti ant tūbelės. Išorinę pakuotę ir tuščias tūbeles galima išmesti su buitinėmis atliekomis.

14. INFORMACINIO LAPELIO PASKUTINIOJO APROBAVIMO DATA

2010-03-15

15. KITA INFORMACIJA

Tik veterinariniam naudojimui.

Parduodama be veterinarinio recepto.

Farmakoterapinė grupė: ektoparazitocidinės medžiagos. ATCvet kodas: QP53AX17

Imidaklopridas, 1-(6-chloro-3-piridilmetil)-N-nitro-imidazolidin-2-ylidenaminas, yra ektoparazitocidinė medžiaga, priklausanti chloronikotilinių junginių grupei. Chemiškai tiksliau apibūdinamas kaip chloronikotinilo nitroguanidinas.

Norint gauti informacijos apie šį veterinarinį vaistą, prašome susisiekti su tiekimo rinkai teisės turėtojo vietiniu atstovu.